

Traiter le sujet suivant:

Madame "C" âgée de 45 ans est admise à l'hôpital suite à un saignement vaginal entre les cycles menstruels et après des rapports sexuels. Le frottis vaginal a confirmé la présence de cellules cancéreuses et il fut décidé de faire une hystérectomie totale avec ovariectomie bilatérale avec pause de protovac en post opératoire.

- Ordres du médecin :

- sérum mixte 2 ℓ / 24h + 1 amp potassium / litre.
- Lovenox 0.4 s/c / jour.
- Rocephine 1g chaque 8 heures I.V.D.
- Gentamicine 80 mg 2 fois/jour.
- Tramal 1 amp chaque 8 heures sos (au besoin)

Changement quotidien du cathétérisme urinaire et soin de la sonde urinaire.

Traiter obligatoirement les questions suivantes:

1^{ère}: Questions en rapport avec le cas

- 1- Frottis vaginal : a- Définition.
b-Indications et conditions. (2 pts)
- 2- Pourquoi ferme-t-on la sonde urinaire périodiquement toutes les 4 heures avant de l'enlever après une hystérectomie? (1 pt)
- 3- Quelles sont les instructions à donner à madame "C" pour prévenir les complications des thromboses? (1 pt)
- 4- Donner le plan infirmier à Mme "C" pour le 1^{er} jour post opératoire (4 diagnostics infirmiers, objectifs et interventions infirmières). (4 pts)
- 5- Quels sont les buts :
Des exercices de Keggel – de l'hystérosalpingographie – De la laparoscopie des organes reproductifs féminins. (2 pts)
- 6- Existe-t-il un plan médical et alimentaire à donner à cette dame après ovariectomie bilatérale? Justifier votre réponse. (1 pt)

2^{ème}: Questions en dehors du cas

- 7- Enumérer les tests sanguins de laboratoire que le couple doit accomplir pour déceler les causes de stérilité. (1 pt)
- 8- Fécondation in vitro (F.I.V)
a- Définition.
b- Quelles sont les instructions après deux semaines de la fécondation in vitro.
c- On a prescrit à la dame du Duphaston (progestérone) pendant les six premières semaines après la F.I.V? Quel est le but de la prescription de la progestérone après la F.I.V? Et quels sont ses effets secondaires ? (2 pts)
- 9- a- Quelle est la physiopathologie de la pyéloglomérulonéphrite?
b- Quelles sont ces manifestations cliniques chez les enfants. (1 pt)
- 10- a- Définir G6PD.
b- Quelles sont les instructions à donner à domicile aux parents ayant un enfant déficient en G6PD? (1 ½ pts)
- 11- Donner le plan infirmier (4 diagnostics infirmiers, buts, interventions infirmières) à un enfant souffrant de déshydratation à cause de reflux gastro-œsophagien. (3 ½ pts)

Treat the following subject:

Mrs "C" 45 years old admitted to the hospital due to vaginal bleeding between the menstrual periods and after sexual intercourse. Pap's smear confirmed the presence of cancerous cells and it was decided to undergo total hysterectomy with bilateral ovariectomy and to put a portovac post-operative.

- Medical orders :

- Mixed 2 ℓ /24 h +1 amp Potassium / ℓ
- Lovenox 0.4 s/c Daily.
- Rocephine 1 g 8 h IVD.
- Gentamicin 80 m Bid IVD.
- Tramal 1 amp. q 8 h PRN.
- Daily dressing & foley care.

Treat obligatory all the following questions:

1st: Questions related to the case.

- 1- Pap's smear: a – definition.
b- Its indications and conditions. (2 pts)
- 2- Why do we clamp the foley catheter periodically every four hours before we remove it after hysterectomy? (1 pt)
- 3- What are the instructions we give for Mrs "C" to avoid complications of thrombosis? (1 pt)
- 4- Give the nursing care plan for Mrs "C" in the first day post operative (4 nursing diagnosis, objectives, and nursing interventions).(4 pts)
- 5- What are the goals of :
Keggel's exercise - hysterosalpinography –Female reproductive organs' laparoscopy. (2 pts)
- 6- Is there any medical and nutritional plan for this lady post bilateral ovariectomy. Justify your answer. (1 pt)

2nd: Questions unrelated to the case.

- 7- Enumerate the laboratory blood tests that a couple should do to detect causes of sterility. (1 pt)
- 8- IVF In vitro fecondation :
a- Definition.
b- What are the instructions after two weeks of IVF?
c- The lady was given Duphaston (progesterone) for the first six weeks after IVF application .What is the goal of giving progesterone after IVF and what is its side effects? (2 pts)
- 9- a- What is the pathophysiology of pyelo glomerulo-nephritis.
b- What are the clinical manifestations in children? (1 pt)
- 10- a- Define G6PD.
b- What are the home instructions to be given for the parent who have a kid with G6PD deficiency? (1 ½ pts)
- 11- Give the nursing care plan (four nursing diagnosis-goals-nursing interventions) for a child suffering of dehydration due to gastro-esophageal reflux. (3 ½ pts)

عالج الموضوع التالي:

أدخلت سيدة "ج" "45 سنة" ، الى المستشفى بسبب نزيف مهبلي بين الدورات الشهرية وبعد العلاقة الجنسية. أثبت فحص المسحة المهبلية (فحص الزجاجة) وجود خلايا سرطانية وتقرّر اجراء عملية جراحية لاستئصال كلي للرحم مع استئصال المبيضين ووضع Portovac بعد إجراء العملية .

أوامر الطبيب :

- Mixed 2 ℓ /24 h. + 1 amp Potassium 1 / ℓ.
- Lovenox 0.4 s/c Daily.
- Rocephine 1 g q 8 h IVD.
- Gentamicin 80 mg Bid IVD.
- Trammal 1 amp. q 8 h PRN.
- Daily dressing & foley care.

عالج إلزاميا" الأسئلة التالية:

أولاً:" أسئلة من الحالة:

1 - فحص الزجاجة :

أ - تعريفه.

ب -دواعي إجرائه وشروطه.

- (علامتان)
- 2 - لماذا تقفل (نسكر) الميل البولي دوريًا" كل 4 ساعات قبل نزعها بعد عملية استئصال الرحم؟
- (علامة واحدة)
- 3 - ما هي الارشادات التي تعطى للسيدة "ج" لتجنب مضاعفات التجلط الدموي؟
- (علامة واحدة)
- 4 - أعط الخطة التمريضية للسيدة "ج" لأول يوم بعد العمل الجراحي (4 تشخيصات تمريضية ، الأهداف ، الإجراءات التمريضية). (4 علامات)
- 5 - ما هي الأهداف لـ :
- (علامتان)

تنظير الأعضاء التناسلية للمرأة – Kegel's exercises - hystérosalpingography

6 - هل توجد خطة دوائية وغذائية لهذه السيدة بعد استئصال المبيضين؟ علّل الاجابة.

ثانياً:" أسئلة خارج الحالة:

7 - عدّد فحوصات الدم المخبرية التي يخضع لها الزوجين لاكتشاف أسباب العقم.

8 - I.V.F. – In Vitro Fecondation طفل الأنبوب .

أ - تعريفه .

ب - ما هي الارشادات بعد اسبوعين من اجراء IVF.

ج - أعطيت السيدة Duphaston (progesterone) لمدة 6 اسابيع بعد اجراء IVF.

ما هو الهدف من اعطائها Progeterone بعد IVF وما هي تأثيراته الجانبية ؟

9 - أ- ما هي الآلية المرضية لـ Pyeloglomerulonephritis

ب- ما هي عوارضها السريرية عند الأطفال ؟

10 - أ- عرّف /ي التفويل G6PD .

ب- ما هي الارشادات المنزلية التي تعطى للأهل للعناية بطفل عنده G6PD ؟

11 - أعط الخطة التمريضية (4 تشخيصات تمريضية – أهداف – اجراءات تمريضية) لطفل يعاني من التجفاف بسبب

(ثلاث علامات ونصف) (gastro esophageal reflux) الارتداد المعوي .